


感染性胃腸炎週報 2015年 第4週 (1月19日～1月25日)








○感染性胃腸炎は、県全体で462名(定点あたり8.39→8.56人)の報告がありました(54定点医療機関報告)。





※感染性胃腸炎は秋から翌年の春にかけて流行するため、27週～翌年26週でグラフを作成しています。

感染性胃腸炎は、県全体で462名(定点あたり8.39→8.56人)の報告があり、前週とほぼ同数でした。12月をピークに報告数は減少していましたが、第1週(12/29～1/4)からは横ばいで推移しており、依然として多くの患者が報告されています。全国では、冬の感染性胃腸炎の原因であるノロウイルスの集団感染も発生しています。学校や福祉施設、病院などでは、手洗いの徹底や下痢便・嘔吐物の適切な処理など、感染予防と拡大防止に努めてください。

◆地域別・年齢別発生状況



地域別では、倉敷市と美作地域を除く地域で前週より患者数が増加し、備北地域（14.00人）、備前地域（11.50人）、真庭地域（11.00人）の順で定点あたり報告数が多くなっています。年齢別累計では、5歳以下の乳幼児が全体の61%を占めています。



ノロウイルスに感染しないためには

1. 最も大切なことは手を洗うことです。

排便後や、調理・食事の前には、石けんと流水で十分に手を洗いましょう。

2. 処理をする人自身が感染しないように気をつけましょう。

嘔吐物や下痢便にはウイルスが大量に含まれています。処理するときは、使い捨ての上着や、マスク、手袋を着用し、下痢便、嘔吐物をペーパータオル等で静かに拭き取った後は、**次亜塩素酸ナトリウム（家庭用塩素系漂白剤でも代用可）**で浸すように床を拭き取り、その後水拭きをします。また、処理をした後はしっかりと流水で手を洗いましょう。ノロウイルスにアルコールは消毒効果が低いとされています。

3. 嘔吐物や下痢便で汚れた衣類は、**85℃で1分以上の熱水洗濯か次亜塩素酸ナトリウム（家庭用塩素系漂白剤でも代用可）**の消毒が有効です。

嘔吐物や下痢便で汚れた衣類は、付着した汚物を除去し、洗剤を入れた水の中で静かにもみ洗った後、熱水洗濯か次亜塩素酸ナトリウムで消毒をしましょう。

※塩素系漂白剤の使用に当たっては「使用上の注意」を確認しましょう。

4. 食品は、中心部まで十分に加熱しましょう。（中心部を85～90℃で90秒間以上）

[ノロウイルスに関するQ&A（厚生労働省ホームページ）](#)


[食中毒（ノロウイルス）注意報を発令中です（岡山県ホームページ生活衛生課）](#)



岡山県地区別 感染性胃腸炎感染症マップ 2015年 4週

2015年1月29日

10:15:42



感染性胃腸炎

レベル3		レベル2	レベル1	報告なし
開始基準値	終息基準値	基準値	基準値	基準値
20	12		0 < 20 未満	0

レベル3の開始基準値を一度超えると、終息基準値より下がらないとレベル3が継続されます。