


# 感染性胃腸炎週報 2017年 第8週 (2月20日～2月26日)

## ➤ 岡山県の流行状況

○感染性胃腸炎は、県全体で189名（定点あたり3.50人）の報告がありました（54定点医療機関報告）。













※感染性胃腸炎は秋から翌年の春にかけて流行するため、27週～翌年26週でグラフを作成しています。

感染性胃腸炎は、県全体で189名（定点あたり3.20→3.50人）の報告があり、前週とほぼ同数でした。地域別では、美作地域（5.17人）、真庭地域（4.50人）、備前地域（4.10人）の順で定点あたり報告数が多くなっています。

冬の感染性胃腸炎の原因は、ノロウイルスやロタウイルスなどのウイルスによるものが多いとされています。手洗いの徹底や、下痢便・おう吐物の適切な処理など、感染予防と拡大防止に努めてください。

### ◆地域別・年齢別発生状況





第8週年齢別割合では、0-2歳 23%、3-5歳・20歳以上 22%、6-9歳 19%の順で高くなっており、特に0-2歳と20歳以上の割合が前週より高くなっています。

例年3~5月には、2歳以下の乳幼児を中心にロタウイルスによる胃腸炎が増加するとされています。主な症状はおう吐と下痢で、ノロウイルスによる胃腸炎に比べ重症度が高いといわれています。おう吐や下痢により脱水症状を起こすこともありますので、体調の変化に注意し、早めに医療機関を受診してください。

[ロタウイルスに関するQ&A \(厚生労働省\)](#)

## ◆◆ ノロウイルスによる感染性胃腸炎に気をつけましょう ◆◆

### 予 防 方 法

#### 1. 最も大切なことは、手を洗うことです。

排便後や、調理・食事の前には、石けんと流水で十分に手を洗いましょう。

#### 2. 処理をする人自身が感染しないように気をつけましょう。

おう吐物や下痢便にはウイルスが大量に含まれています。処理をするときは、使い捨ての上着や、マスク、手袋を着用し、下痢便、おう吐物をペーパータオル等で静かに拭き取りましょう。

拭き取った後は、**次亜塩素酸ナトリウム**(※家庭用塩素系漂白剤でも代用可)で浸すように床を拭き取り、その後水拭きをしましょう。また、処理をした後はしっかりと流水で手を洗いましょう。

#### 3. おう吐物や下痢便で汚れた衣類は、85℃で1分間以上の熱水洗濯か次亜塩素酸ナトリウム(※家庭用塩素系漂白剤でも代用可)での消毒が有効です。

おう吐物や下痢便で汚れた衣類は、ウイルスが飛び散らないように汚物を除去し、洗剤を入れた水の中で静かにもみ洗った後、熱水洗濯か次亜塩素酸ナトリウムで消毒をしましょう。

#### 4. 食品は、中心部まで十分に加熱しましょう。(中心部を85~90℃で90秒間以上)

二枚貝の生食を控えましょう。中心部までしっかり加熱すれば安心です。

※塩素系漂白剤を使用する際には、「使用上の注意」を確認しましょう。

[ノロウイルスに関するQ&A \(厚生労働省\)](#)


[ノロウイルス感染症とその対応・予防 \(家庭等一般の方々へ\)](#) (国立感染症研究所)



# 岡山県地区別 感染性胃腸炎感染症マップ 2017年 8週

2017年3月1日

9:41:22



## 感染性胃腸炎

| レベル3  |       | レベル2 | レベル1      | 報告なし |
|-------|-------|------|-----------|------|
| 開始基準値 | 終息基準値 | 基準値  | 基準値       | 基準値  |
| 20    | 12    |      | 0 < 20 未満 | 0    |

レベル3の開始基準値を一度超えると、終息基準値より下がらないとレベル3が継続されます。