


カキ漁場珪藻類計数結果



調査点	9月7日		8月17日 (前回)	
	珪藻類	(cells/L)	珪藻類	(cells/L)
2	シュードニッチア属	3,100,000	キートセロス属	283,000
	スケルトネマ属	270,000	スケルトネマ属	141,000
	キートセロス属	67,500	レプトシリンドラス属	9,000
15	タラシオシラ属	410,000	キートセロス属	145,000
	スケルトネマ属	70,000	デトヌラ属	6,000
	シュードニッチア属	6,000	シュードニッチア属	1,000
18	スケルトネマ属	24,000	スケルトネマ属	84,000
	シュードニッチア属	1,800	キートセロス属	29,000
	タラシオシラ属	1,000	シュードニッチア属	8,000
27	シュードニッチア属	318,800	欠測	
	タラシオシラ属	263,800		
	スケルトネマ属	76,300		
41	スケルトネマ属	21,000	キートセロス属	829,000
	コシノディスカス属	16,000	スケルトネマ属	34,000
	アクティノプティクス属	11,000	バクテリアストルム属	31,000
37	スケルトネマ属	24,200	キートセロス属	874,000
	コシノディスカス属	8,900	スケルトネマ属	21,000
	アクティノプティクス属	8,600	ステファノピクシス属	10,000

※海水10倍濃縮で検鏡 ※細胞数の多い順に上位3種を記載

【備考】
