


II-B. コンテナで疑わしいアリ類を発見した場合 (空コンテナ)【港湾等区域を除く】

<バンニング(積荷)作業等>

【準警戒区域】

ヒアリ調査は絶対に素手で行わない!!



<周辺モニタリング調査等(1か月程度)>

⑲ 1週間~10日に1回程度の調査/ベイト剤設置

※新たに発見→⑤へ

## II-B. コンテナで疑わしいアリ類を発見した場合(空コンテナ)【港湾等区域を除く】

<マニュアル対象者>

【準警戒区域】

・運送貨物取扱業者（フォワーダー）	・荷役業者	・バンプール管理者
・コンテナ所有者	・運送業者	・倉庫業者

<手順>

※ヒアリ調査は絶対に素手で行わない!!

①	<b>貨物積込前にコンテナ(内・外部)について可能な限りアリ類等の有無を目視で確認する</b> ・緊急用にエアゾール式殺虫剤を準備しておく。
②	<b>バンニング作業を開始する</b> ・作業中も、アリ類の有無に注意を払う。
③	<b>積込後、可能であれば、コンテナ内にベイト剤を設置後、発送する</b> ・腐食した床材内部にヒアリが生息している可能性がある。 ※海外への輸出の場合は通関手続き上の制約があるので注意
④	<b>作業を中断し、周辺を目視点検</b> ・念のため、周辺のアリ類の有無について改めて目視で点検する。
⑤	<b>生きたアリ個体はエアゾール式殺虫剤等で殺虫する</b> ・目視できた個体はエアゾール式殺虫剤又は液剤によりすべて殺虫する。 ・コンテナの扉付近に注意し、コンテナ外に逃げ出さないようにする。
⑥	<b>殺虫したアリ類(死骸を含む)を同定用に採取する</b> ・「3 同定方法」のサンプル採取手順を参照
⑦	<b>発見現場・アリ類の写真(接写モード等)を撮影する</b> ・発見箇所が特定できるように、現場写真を撮っておく。 ・アリ個体はデジカメの接写モード等で出来るだけピントを合わせて撮影する。 ・ヒアリの特徴である触角や2節(こぶ)の腹柄、背中トゲの有無等が分かるよう、様々な角度から撮影する。
⑧	<b>コンテナを閉め、ヒアリ確認まで現場に残置しておく</b> ・隙間のないよう密閉し、可能であればくん蒸用に通気口等を目張りを行う。 ・発見したアリ類の同定が終わるまで、出来るだけその場から動かさない。 ・可能であれば、念のため、コンテナ内部にベイト剤を設置する。(周囲はヒアリ確定後)
⑨	<b>発見したアリの簡易同定を実施する</b> ・肉眼又はルーペ等で確認できる範囲で「疑わしい」かどうかを判別する。 ・「3 同定方法」のスクリーニング手順を参照
⑩	<b>関係機関へ連絡する</b> ・簡易同定でヒアリの疑いがある場合は、すぐに連絡する。
⑪	<b>殺虫したアリ類等はすべて採取し、県又は環境省へ提出し、同定を依頼</b> ・死骸を潰さないよう集めて採取し、環境事務所等へ持ち込み同定を依頼する。 ・可能な限り、当初の発見個体及びその後の調査等での発見個体のすべてを採取する。
⑫	<b>バンプール管理者又は県、市町村、環境事務所と対応を協議する</b> ・現場の状況、コンテナの状態(腐食の有無等)などを踏まえ、コンテナのくん蒸処理の必要性、周辺コンテナの移動制限やトラップ等によるバンプール内の周辺生息確認調査の必要性について協議する。 ・コンテナ所有者との交渉等についても協議する。 ・コンテナの搬入経路、一時的に留置された経路地、直近の積荷等の調査が必要。
⑬	<b>コンテナ所有者等の了解を得て、⑫ a. b. を実施</b> ・家庭用、厨房用等のくん蒸殺虫剤でよい。(出来るだけ目張りをする事。) ・周辺コンテナ及びバンプール内の舗装面等で目視及びトラップ調査等を実施する。 ・移動制限や調査等についてコンテナ所有者の了解が得られない場合は、再度、バンプール管理者又は県、市町村、環境事務所と協議する。
⑭	<b>くん蒸処理後、コンテナ内を再度確認する</b> ・アリ類の生き残り等に注意しながら作業する。 ・腐食した床材の内部等に生息している可能性があるので注意する。 ・再確認で新たにアリ類を発見した場合は、殺虫処理等の手順に戻る。
⑮	<b>周辺の生息確認調査で新たに発見されなければ移動制限を解除する</b> ・調査結果を踏まえ、バンプール管理者や県、市町村、環境事務所と協議の上判断する。
⑯	<b>判明した経路地、直近の積荷等について、関係事業者、荷主等へ注意喚起又は調査依頼</b> ・拡散が懸念されるコンテナ経路地の関係事業者や直近の積荷の荷主等に注意喚起等する。
⑰	<b>積込後、可能であれば、コンテナ内にベイト剤を設置後、発送する</b> ③と同じ。
⑱	<b>発送時、搬送先へ注意喚起する</b> ・アリ類の生き残りがいる可能性があるため、搬送先の関係者に注意喚起をする。
⑲	<b>&lt;周辺モニタリング調査等(1か月程度)&gt;</b> <b>1週間~10日に1回程度の調査/ベイト剤設置</b> ・発見場所周辺でヒアリの生息調査を行う。(1週間程度を目安に1か月継続する) ・ヒアリ定着及び拡散防止のため、ベイト剤設置を2週間~1か月程度ごとに行う。