

食べないで!




それ、**毒キノコ** じゃないですか!!



本年は、自ら、または家族が採取した野生キノコによる食中毒事案が増加しています。

年別（1月～10月）にみた毒キノコによる食中毒事案（2017～2020年）



2020年1月～10月までの毒キノコによる食中毒事案（速報値）

キノコの種類	件数	患者数
ツキヨタケ	13(12)	33(29)
クサウラベニタケ	5(2)	19(6)
不明	2(2)	5(3)
カキシメジ	1(1)	3(3)
カエンタケ	1(1)	1(1)
ドクササコ	1(1)	1(1)
カヤタケ	1(1)	2(2)

※カッコ内は自ら、または家族が採取した野生キノコによる食中毒事案

⚠️ 食用と確実に判断できないキノコは、

採らない！ 食べない！

売らない！ 人にあげない！

絶対に

(例)

ツキヨタケ



【中毒症状】
ツキヨタケは食後30分～1時間程度で嘔吐，下痢，腹痛などの中毒を起こす。

【間違えやすいキノコ】
・ヒラタケ
・ムキタケ
・シイタケ

クサウラベニタケ



【中毒症状】
クサウラベニタケは食後20分～1時間程度で嘔吐，下痢，腹痛など消化器系の中毒を起こす。唾液の分泌、瞳孔の収縮、発汗などの症状も現れる。

【間違えやすいキノコ】
・ウラベニホテイシメジ
・ホンシメジ
・ハタケシメジ



キノコを食べて体調が悪くなったら、すぐに医師の診察

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/syokuchu/poison/index.html