

Ⅲ がん死亡数及び死亡率

1. 死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率および死亡割合（主要部位別、男女別）

岡山県の2012年のがん死亡数、粗死亡率及び年齢調整死亡率、死亡割合を男女別、主要部位別に示した（表4）。

がん死亡数については人口動態統計の数値（外国人を含まない）を使用した。

県内のがん死亡者数は男が3,375人、女2,241人。合計5,616人に上り、全死亡者21,181人の約26.5%を占めている。

部位別死亡数では肺が最も多く、男870人、女301人となっており、次いで胃の男482人、女290人となっている。

年齢調整死亡率（人口10万対）をみると、男では肺（41.6）、胃（24.5）が高く、女では乳房（11.0）、大腸（10.5）の順になっている。


死亡割合についてみると、男では肺（25.8%）、胃（14.3%）、肝臓（10.2%）が、女では肺（13.4%）、次いで胃（12.9%）、大腸（12.9%）が上位3位を占めた。

表4 死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率および死亡割合：主要部位別、男女別 2012年

部位	死亡数			粗死亡率		年齢調整死亡率		死亡割合	
	男	女	計	男	女	日本人人口 ^(*1)		男	女
全部位	3,375	2,241	5,616	363.3	222.4	168.6	83.3	100.0%	100.0%
口腔・咽頭	65	40	105	7.0	4.0	3.7	1.6	1.9%	1.8%
食道	162	28	190	17.4	2.8	9.2	1.2	4.8%	1.2%
胃	482	290	772	51.9	28.8	24.5	10.0	14.3%	12.9%
大腸	330	289	597	35.5	28.7	17.2	10.5	9.8%	12.9%
結腸	206	219	425	22.2	21.7	10.2	7.5	6.1%	9.8%
	直腸	124	70	194	13.3	6.9	7.0	3.0	3.7%
肝臓	343	181	524	36.9	18.0	17.4	5.8	10.2%	8.1%
胆嚢・胆管	133	133	266	14.3	13.2	6.0	3.6	3.9%	5.9%
膵臓	255	232	487	27.5	23.0	13.9	8.3	7.6%	10.4%
喉頭	8	2	10	0.9	0.2	0.5	0.1	0.2%	0.1%
肺	870	301	1,171	93.7	29.9	41.6	9.8	25.8%	13.4%
皮膚 ^(*2)	8	11	19	0.9	1.1	0.3	0.3	0.2%	0.5%
乳房	1	188	189	0.1	18.7	0.1	11.0	0.0%	8.4%
子宮	-	85	85	-	8.4	-	4.4	-	3.8%
卵巣	-	67	67	-	6.6	-	3.2	-	3.0%
前立腺	194	-	194	20.9	-	7.6	-	5.7%	-
膀胱	80	39	119	8.6	3.9	3.4	0.9	2.4%	1.7%
脳・神経系	22	15	37	2.4	1.5	1.5	0.8	0.7%	0.7%
悪性リンパ腫	89	75	164	9.6	7.4	4.4	2.5	2.6%	3.3%
白血病	69	53	122	7.4	5.3	4.0	1.8	2.0%	2.4%
日本人人口 ^(*1) : 1985年日本人モデル人口									
皮膚 ^(*2) : 皮膚の黒色腫を含む									

上位 9 位の部位別死亡割合を男女別にグラフで示した（図 14）。

図 1 4 部位別死亡割合（%）2012 年：主要部位別



2. 岡山県と全国の死亡率の比較

年齢調整死亡率を全国値と対比した（表 5、図 15、16）。岡山県の全国に対する比をみると全部位の男では 0.96、女では 0.92 と全国を下回った。

部位別にみると、男では食道が 1.08、膵臓が 1.05、肝臓が 1.04、肺が 1.02 と全国を上回り、次いで前立腺が 1.0 と全国と同等であった。女では胃が 1.05、肝臓が 1.04、食道が 1.02 で全国を上回った。

岡山県では男女ともに年齢調整罹患率（2011 年）の全部位は全国値を上回っているものの、年齢調整死亡率は全国値を下回っている。

	年齢調整死亡率 ^(*)						年齢調整罹患率 ^(**) 2011年	
	男		女		岡山/全国		岡山/全国	
	岡山	全国	岡山	全国	男	女	男	女
全部位	168.6	175.7	83.3	90.3	0.96	0.92	1.01	1.07
食道	9.2	8.5	1.2	1.2	1.08	1.02	1.01	0.99
胃	24.5	26.1	10.0	9.6	0.94	1.05	0.93	0.91
大腸	17.2	21.4	10.5	12.3	0.80	0.85	1.14	1.13
{ 結腸	10.2	13.0	7.5	8.7	0.78	0.87	1.14	1.07
{ 直腸	7.0	8.4	3.0	3.6	0.83	0.82	1.14	1.26
肝臓	17.4	16.7	5.8	5.6	1.04	1.04	0.97	1.00
胆嚢・胆管	6.0	6.8	3.6	4.4	0.88	0.81	0.79	0.87
膵臓	13.9	13.3	8.3	8.4	1.05	0.99	0.92	0.93
肺	41.6	41.0	9.8	11.4	1.02	0.86	0.96	0.86
乳房	0.1	-	11.0	11.5	-	0.96	-	0.95
子宮	-	-	4.4	5.4	-	0.82	-	1.63
卵巣	-	-	3.2	4.2	-	0.76	-	0.92
前立腺	7.6	7.6	-	-	1.0	-	0.87	-
膀胱	3.4	3.6	0.9	1.0	0.94	0.94	1.74	1.59
悪性リンパ腫	4.4	5.0	2.5	2.7	0.88	0.93	1.05	1.13
白血病	4.0	4.4	1.8	2.3	0.92	0.76	0.75	0.79

年齢調整死亡率^(*): 岡山の値については、表5から転記した。全国値については人口動態統計による。

年齢調整罹患率^(**): 表3から転記した2011年の年齢調整罹患率。

図15 年齢調整死亡率2012年(男)




図16 年齢調整死亡率2012年(女)

