

## スカイゴールデン適期収穫開始チャート

<p><b>成熟期 3 日前</b></p> <p>子実水分 : 33% 穂首角度 : 約10~15° 等級 : 規格外 出穂からの平均気温の積算 : 約600°C 芒は薄い褐色。穂は全体的に薄い褐色だが、一部の基部には緑色が残る。穂首節間は薄い褐色でやや弾力がある。穂首の湾曲はあまりない。粒は薄い褐色で、腹側に黄緑色が残るものもある。一部爪跡がつくものがあり、切断できる。</p>	  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>収穫直後</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>乾燥後</p> </div> </div>
<p><b>成熟期</b></p> <p>子実水分 : 26% 穂首角度 : 約30~40° 等級 : 大粒 1 等 出穂からの平均気温の積算 : 約650°C 芒は薄い褐色で、穂はすべて緑色が抜け て薄い褐色である。穂首節間は薄い褐色で やや弾力がある。穂首の湾曲が始まり、全 体の 8 割が30° 程度以上。粒は薄い褐色で 表面はなめらかで、爪跡がわずかにつき、 蠅（ろう）程度の硬さで、切断できる。</p>	  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>
<p><b>成熟期 2 日後 (収穫適期)</b></p> <p>子実水分 : 22% 穂首角度 : 約45~55° 等級 : ビール等外上 出穂からの平均気温の積算 : 約690°C 芒、穂及び穂首節間は薄い褐色である。 穂首の湾曲が目立ち、全体の 8 割が45° 程 度以上。粒は薄い褐色で表面はなめらか。 爪跡がわずかにつき、ほぼ切断できない。</p>	  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>
<p><b>成熟期 4 日後 (収穫適期)</b></p> <p>子実水分 : 19% 穂首角度 : 約70~80° 等級 : ビール等外上～ビール 2 等 出穂からの平均気温の積算 : 約730°C 芒、穂及び穂首節間は薄い褐色である。 穂首の湾曲が進み、全体の 8 割が70° 程 度以上。粒は薄い褐色で、腹側にはしわが目 立つ。粒は硬く、爪跡がつかず、切断でき ない。</p>	  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>